

Hartfalen flowchart

Toelichting

Ondersteuning

Symptomen/tekenen HF

LET OP - Indien AF:
NT-proBNP niet betrouwbaar

ECG en NT-proBNP + lab

Niet afwijkend
ECG en/of
NT-proBNP

Afwijkend
ECG en/of
NT-proBNP

HF zeer
onwaarschijnlijk,
verdere pathologie

Verwijs consult
cardioloog

Bij frail/wens patiënt
evt. overleg met
cardioloog middels
MKC + zorg 1e lijn

Geen HF

Diagnose
hartfalen

Zorg 2e lijn -
instellen medicatie

Terugverwijzen naar
1e lijn: stabiel HFpEF,
frail, wens patiënt,
palliatief

Symptomen/tekenen

Dyspnoe bij inspanning, plat liggen of vooroverbuigen, oedemen, moeheid, afname eetlust, nachtelijke dyspnoe/hoest, crepitaties onderste longvelden, hartgeruis, ictus cor buiten midclaviculairlijn, gestuwde vena jugularis

Consultatie
kaderhuisarts
Via VipLive

Lab

Hb, MCV, kreatine, eGFR, ureum, Na, K, TSH, glucose, lipidenprofiel

Voor behandeling & diagnostiek
AF - Volg NHG standaard

Afkapwaarden

NT-proBNP 125 pg/ml (=15 pmol/L)
Indien AF: volg NHG standaard AF

Meekijkconsult
cardiologie
Via VipLive

Medicatie 1e lijn

Zie medicamenteuze
standaard NHG

Verwijzing inclusief

Voorgeschiedenis/correspondentie, medicatie, diagnostisch dossier, gerelateerde ICPC-codes

Medicatie 1e lijn

Zie medicamenteuze
standaard NHG

Telefonisch
contact
hartfalenpoli

Hartfalen traject

